

新型コロナワクチン接種の予約方法(65歳以上)

ワクチン接種は、**完全予約制**です。事前に予約が無い方は、接種できません。

★コールセンター開設日：令和3年4月1日（木）

★予約開始日：**令和3年4月19日（月）**

予約は以下の手順を参照しながら行ってください。

予約手順1 本案内と接種券をお手元にご用意ください。

(1) 本案内の**裏面**を参照し、ご希望の接種医療機関または集団接種のいずれかを決める。

(2) 希望の接種日と接種時間を決定。

(希望の候補日がすでに定員に達している場合もありますので第3候補程度ご準備ください)

※基礎疾患を治療中の方は、**必ず主治医にご相談の上、接種予約をしてください。**

主治医に相談をされていない場合は、**当日の接種を見合わせる可能性があります。**

予約手順2 「新型コロナワクチンコールセンター」に電話をかける。

フリーダイヤル **0120-983-049**

受付時間 8:30~18:00

(土・日・祝日を除く)

ワクチン接種の予約であることを伝えてください。接種券面を参照しながら、コールセンターの案内に従い、予約してください。

接種券			
券種	2	ワクチン接種	1回目
請求先	ささささささささささ		444444
券番号	555555555		
氏名	内灘 太郎		
			
222222222222222222			

接種券番号(10桁)

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時) Certificate of Vaccination for COVID-19	
1回目	
接種年月日	2021年 4月7日
接種場所	p Fizer/Lot
接種年月日	
ワクチン種類	

接種日当日の持ち物

- * 接種券
- * 予診票 (必ず記入してきてください)
- * 本人確認書類 (運転免許証、健康保険証等)
- * 住所地外接種届出済証 (河北郡市、金沢市、野々市市、白山市以外で接種希望の方に限る)
- * 内服中の薬の内容が分かる物 (お薬手帳など)

接種場所・日程

●個別接種

接種開始日：5月7日(金)～

接種実施日：(月)～(土)

実施時間：診療時間内

医療機関名			
秋山クリニック	ハマナス1-8-1	茶谷医院	西荒屋53
紺井医院	緑台1-8	政岡医院	鶴ヶ丘4-1-265
田中医院	向陽台2-224	村田医院	鶴ヶ丘2-8
つねファミリークリニック	白帆台2-1		

※医療機関では予約受付していません。

●集団接種

接種開始日：5月9日(日)～

接種会場：内灘町役場(1階町民ホール)

実施時間：9～12時/13時30分～16時

実施曜日：木曜日・日曜日

※都合により実施しない場合がございます。

※※ご注意※※

*キャンセルする場合

コールセンターに連絡し、キャンセルと再予約をお願いします。

*新型コロナウイルスワクチンの供給状況によっては、予約日のご希望に添えない場合があります。

★河北郡市以外の場所でのワクチン接種をご希望の場合の予約方法

(1)金沢市・白山市・野々市市の医療機関で受けたい場合

ご希望の接種医療機関に直接電話で予約をしてください。

(2)上記以外の市区町村で受けたい場合、「住所地外接種届出済証」が必要です。

ご希望の接種機関(医療機関、集団接種会場)のある市区町村の役場にお問合せください。

ワクチン接種についての注意点

*ワクチンは、体調の良いときに接種するようにしましょう。

*基礎疾患のある方は必ず**主治医とご相談の上**、接種可能か判断し、予約をしてください。

*接種の際は、**肩を出しやすい服装**でお越しください。

*接種後、会場で15分または30分程度体調観察のため、待機していただきます。

*ワクチン接種は、1回目から3週間が経過後、2回目を接種できます。

2回目を忘れないように接種しましょう。

*接種後の体調不良時は、主治医にご相談ください。

*ワクチン接種に関するご相談、ご質問、クーポンの再発行は、コールセンターで受け付けます。

WEBから予約する方法

*右記QRコードを読み込み、アクセスする。

*お手元に接種券をご用意の上、必要事項を入力後、希望の接種場所、日時を選択し、予約してください。

WEBからの予約



新型コロナワクチン 接種について

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、**医療従事者等**、**高齢者**、**基礎疾患のある方等**から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

内灘町からの案内を参照し、ワクチン接種の予約をしましょう。

2 医療機関/接種会場を探す

3 基礎疾患がある場合、主治医に 接種可能か確認


4 予約して、ワクチンを受ける



※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。
住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

当日の
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。

※ 肩を出しやすい服装でお越しください。

※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※ 同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。
毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年3月18日時点）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 3. 慢性の腎臓病 | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） |
| 4. 慢性の肝臓病（肝硬変等） | 11. 染色体異常 |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 | 12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） |
| 6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |
| 7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） | 14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） |

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- （※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- （※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス (ヘキサン - 6 , 1 - ジイル) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル) ◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド ◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。