

新型コロナウイルスワクチン接種について

ワクチン接種を希望する場合は、予約が必要です

- 予約方法は下記をご覧ください。 直接医療機関で予約はできません。
- ワクチン接種は1回目の接種後、3週間の間隔を空けて2回目の接種を受けてください。

電話予約はコールセンターへ

☎0120-061770 (通話無料)

受付時間：午前9時～午後6時（土日祝日も対応）

※混雑状況によってはつながりにくい場合があります。
※ご家族さまが代理として予約いただくこともできます。

電話予約の場合、
2回目の予約も
可能です。



ウェブ予約はこちら（24時間対応）

URL:<https://town-marumori.vaccine-revn.jp>

※予約の際は、1回ずつの予約となるため、「2回分」ご予約ください。
※4月26日午前9時からウェブ予約開始となります。

◇ 予約受付 4月26日午前9時開始

◇ 接種開始 5月11日以降

ワクチンを接種できる医療機関

医療機関名	住所	接種可能日・時間						
			月	火	水	木	金	土
丸森病院	丸森町字鳥屋27	午前	—	—	—	—	—	●
		午後	●	●	●	●	●	—
三澤医院	丸森町字大館3丁目110	午前	●	●	●	●	●	●
		午後	●	●	●	—	●	—
山本医院	丸森町字町西62-1	午前	●	●	●	●	●	●
		午後	●	●	—	●	●	—

※ワクチンの供給状況によって変更となる場合があります。実際の接種予定日は予約時にご確認ください。
※町外のかかりつけ医療機関で接種を希望される方や入院または施設入所されている場合は、直接医療機関または施設へご相談ください。

予約日を記入し、忘れずに接種に行きましょう！

【接種する医療機関： 丸森病院 三澤医院 山本医院】

1回目

月 日

時 分



2回目

月 日

時 分

裏面もご覧ください

送付内容

- ・新型コロナウイルスワクチン接種券
- ・予診票 2枚
- ・ワクチン（ファイザー）の説明書
- ・予診票の記入例
- ・本通知

※2回分の接種券が入っています。失くさないようにご注意ください。

※接種券のシール部分をはがしたり、切り離したりせず、台紙ごと大切に保管してください。

ワクチン接種当日の持ち物・服装

- 持ち物 ①接種券（必須）②保険証 ③予診票（記入してお持ちください）
④おくすり手帳（普段飲んでいるお薬が分かるもの）

服装 肩を出しやすい服でお越しください。

接種にあたってのお願い

- ・予診票は、別紙の記入例をご参照のうえ、ご記入ください。
- ・病気の治療で通院している方、薬の服用がある方は、かかりつけ医に事前にご相談ください。
- ・体調不良等によりキャンセルとなった場合は、お早目にコールセンターへご連絡ください。

【丸森病院で接種する方へのお願い】

- ・車いすをご利用になりたい場合は、予約時にコールセンターにご相談ください。
- ・問診や体に不安がある方は、ご家族がお付き添いのうえご来院ください。
- ・トイレは混み合う可能性があります。可能な限りご自宅で済ませてきてください。
- ・密を避けるため、院内へ立ち入る人数を制限しています。予約時間通りにご来院ください。

- ・新型コロナワクチン接種は強制ではありません。
- ・新型コロナワクチンの安全性や有効性については厚生労働省ホームページをご覧ください。

新型コロナワクチン Q&A 検索

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすることができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。