

# 幸手市

## 新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、我慢と不安を抱えた日々を送られていることと存じます。多くの方が、新型コロナウイルスワクチン(以下、「ワクチン」という。)の接種を受けることにより、少しずつ元の日常に戻っていくことを切に願います。

ワクチンは希望するすべての方が接種できます。65歳以上の方はファイザー社のワクチンでの接種となりますので、ファイザー社のワクチンが供給されている間の接種をお願いします。

### ワクチンについて

ワクチンの接種は無料です。

今回新たに承認されたワクチンは2回の接種により、95%の有効性で発熱やせきなどの症状を防ぐ効果が認められています。

ワクチンを接種することは、自分や自分の大切な人だけでなく、医療機関等の負担を減らすための重要な手段にもなります。

### 副反応について

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こす為、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの副反応が生じる可能性があります。また、治療を要したり、障がいが残るほどの副反応は極めて稀ではあるもののゼロではありません。

ワクチン接種後に15分~30分の経過を見て、アナフィラキシー等の症状があった場合は医療従事者が必要な対応を行える体制を整えます。



### 接種会場について

個別接種会場	秋谷病院	中4-14-41	接種日は 各会場で異なります。
	さつて福祉病院	幸手3440	
	堀中病院	東3-1-5	
	東武丸山病院	南2-2-13	
集団接種会場	ウェルス幸手	天神島1030-1	水、木、土、日
	東公民館	下宇和田58-6	
	西公民館	千塚117	各公民館で数日毎の 接種日を設けます。
	南公民館	上高野1194	
	北公民館	内国府間867	

※ワクチンの供給量に限りがあるため、日程については段階的に決定をしていきます。日程等は広報紙やホームページで随時公開します。

※接種の開始は5月からとなります。

# ワクチン接種までの流れ

## ① 予診票の記入

予診票の記入をお願いします。

現在、何らかの病気で治療中の方や接種に不安のある方は、かかりつけ医等と相談の上、ワクチンを接種するかをお考えください。



## ② 接種の予約

予約は4月2日よりコールセンターで受け付けます。

※ワクチンの供給量により予約をお待ちいただく場合があります。

TEL: 0480-40-4020 FAX: 0480-42-2130

受付時間 月～金(祝日除く) 9:00～17:00

コールセンターでは、ワクチンに関する一般的な相談(接種のスケジュールや方法、接種券の再発行に関する事など)もお受けします。

## ③ ワクチンを受ける

肩を出しやすい服装でお越しください。※着替えのスペースはありません。

下記の3点が必ず必要となります。お忘れの場合は接種が出来ません。

①接種券 ②本人確認書類(健康保険証、運転免許証等) ③予診票

なお、予診票はあらかじめ記入してきてください。

### ※諸注意

・接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控え、コールセンターにご連絡ください。

※医療機関での接種の場合もコールセンターにご連絡ください。

・ワクチンは2回接種し、1回目と2回目の間は21日あける必要があります。また、1回目と2回目は同じワクチンとなります。

・ワクチンの接種は任意であり、義務ではありません。

## 幸手市ホームページ

接種スケジュール等について随時更新をしております。

Web上でも予約が可能です(予約は4月2日から)。

市ホームページから予約ページへ接続できます。

市ホームページ  
QRコード



## 新型コロナウイルスワクチン接種市民向け説明会

4月22日(木)	北公民館 レクリエーションホール	10:00 から	定員60名
4月24日(土)	ウェルス幸手 研修室	14:00 から	定員50名

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止又は延期する場合があります。

※予約制です。参加を希望される方は健康増進課までご連絡ください。

TEL: 0480-42-8421 FAX: 0480-42-2130

ワクチン供給量が安定していないため、接種券は、感染リスクの高い75歳以上の方から段階的に送付をしております。

# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。  
 本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ビス（ヘキサ-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。